

INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCEGO

TEST NR 04N1818

- * Test składa się ze **140** zadań egzaminacyjnych obejmujących całość zagadnień z bloku specjalistycznego i ogólnozawodowego.
- * Przewidywany czas na rozwiązywanie testu: 140 minut.
- * Odpowiedzi proszę udzielać na załączonym formularzu odpowiedzi.
- * Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać 1 punkt.
- * Zaliczenie testu następuje po uzyskaniu 70% prawidłowych odpowiedzi tj. 98 punktów.
- * Wynik rozpatrywany jest w dwóch kategoriach: pomyślny, niepomyślny.

Ze względu na elektroniczną formę sprawdzania wyników egzaminu, należy przestrzegać następujących zaleceń:

- => Proszę uważnie przeczytać treść zadań egzaminacyjnych. Spośród 4 proponowanych odpowiedzi wybrać **jedną** i zaznaczyć starannie **ołówkiem** (zgodnie z WZOREM ZAZNACZANIA znajdującym się w lewym górnym rogu Formularza odpowiedzi do testu).
- => Zaznaczenie **więcej niż jednej odpowiedzi** traktowane jest jako odpowiedź błędna.
- => Zaznaczoną pomyłkowo odpowiedź należy **starannie wytrzeć gumką** i wyraźnie zaznaczyć wybraną odpowiedź.
- => Na formularzu odpowiedzi nie można stosować korektora.

Życzymy powodzenia
Państwowa Komisja Egzaminacyjna

Zadanie 1.

Dla ośrodków o III stopniu referencyjności wymagana liczba stanowisk neonatologicznych na 1000 porodów rocznie, wynosi:

- A. 1,
- B. 2,
- C. 3,
- D. 4.

Zadanie 2.

Hiperglikemia w okresie noworodkowym może przebiegać bezobjawowo lub wywoływać wiele objawów. Do objawów tych NIE należy:

- A. gorączka,
- B. brak przyrostu lub spadek masy ciała,
- C. obrzęk kończyn dolnych,
- D. odwodnienie.

Zadanie 3.

Do bezwzględnych przeciwwskazań żywienia drogą przewodu pokarmowego NIE należą:

- A. martwicze zapalenie jelit,
- B. mechaniczna niedrożność przewodu pokarmowego,
- C. krwawienie do przewodu pokarmowego,
- D. perforacja jelita.

Zadanie 4.

Noworodek matki zakażonej wirusem HIV:

- A. powinien być zaszczepiony przeciwko WZW typu B w ciągu pierwszych 24 h życia,
- B. powinien mieć odroczone szczepienie BCG do czasu wykluczenia zakażenia wirusem HIV u dziecka,
- C. nie powinien być zaszczepiony przeciwko WZW typu B i BCG do czasu wykluczenia zakażenia wirusem HIV u dziecka
- D. prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 5.

Siara najczęściej pojawia się w piersiach około:

- A. 8 tygodnia ciąży,
- B. 10 tygodnia ciąży,
- C. 16 tygodnia ciąży,
- D. 24 tygodnia ciąży.

Zadanie 6.

Rezygnacja z „uporczywej terapii” w przypadku noworodka ze skrajnie małą masą urodzeniową, z bardzo złymi prognozami co do rokowania, oznacza:

- A. zaprzestanie, za zgodą osób uprawnionych, zabiegów medycznych kosztownych, ryzykownych, nadzwyczajnych i niewspółmiernych do spodziewanych rezultatów,
- B. zaprzestanie, za zgodą osób uprawnionych, wykonywania działań opiekuńczych,
- C. prawidłowe odpowiedzi A i B,
- D. żadna z powyższych odpowiedzi.

Zadanie 7.

Hipoglikemia we wczesnym okresie po urodzeniu może powodować:

- A. wzrost osmolarności,
- B. gorączkę,
- C. uszkodzenie oun,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 8.

Dostateczną ilość surfaktantu stwierdza się w płucach noworodka, po:

- A. 36. tygodniu ciąży,
- B. 34. tygodniu ciąży,
- C. 30. tygodniu ciąży,
- D. 28. tygodniu ciąży.

Zadanie 9.

Bardzo małe ciemiączko u noworodków jest charakterystyczne dla:

- A. małopłowia,
- B. wrodzonej łamliwości kości,
- C. wcześniaków,
- D. prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 10.

U noworodka pieluszki należy zmieniać:

- A. co 3 – 4 godziny oraz po każdorazowym oddaniu moczu lub stolca,
- B. co 12 godzin oraz po każdorazowym oddaniu moczu lub stolca,
- C. co 1 – 2 godziny oraz po każdorazowym oddaniu moczu lub stolca,
- D. co 8 godzin oraz po każdorazowym oddaniu moczu lub stolca.

Zadanie 11.

W hiperglikemii górna granica stężenia glukozy we krwi u noworodka wynosi:

- A. 120 mg%,
- B. 130 mg%,
- C. 150 mg%,
- D. 165 mg%.

Zadanie 12.

Badania przesiewowe u noworodków należą do działań z zakresu profilaktyki:

- A. pierwotnej,
- B. pierwszorzędowej,
- C. drugorzędowej,
- D. trzeciorzędowej,

Zadanie 13.

U noworodka donoszonego tkanka tłuszczowa stanowi:

- A. 5-10% masy ciała,
- B. 10-15% masy ciała,
- C. 15-20% masy ciała,
- D. około 25% masy ciała.

Zadanie 14.

Utrata ciepła u noworodka przez kontakt z zimnymi przedmiotami, to:

- A. przewodzenie,
- B. konwekcja,
- C. parowanie,
- D. promieniowanie.

Zadanie 15.

Oddzielenie się pępowiny opóźnia:

- A. stosowanie środków antybakteryjnych,
- B. zakażenia,
- C. cięcie cesarskie,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 16.

Skóra wcześniaka ma mniejszą ilość kolagenu i elastyny oraz charakteryzuje się mniejszą spójnością między naskórkiem a skórą właściwą. Skóra noworodków pełną dojrzałość osiąga:

- A. w 34 tygodniu życia wewnątrzmacicznego,
- B. w 36 tygodniu życia wewnątrzmacicznego,
- C. w 37 tygodniu życia wewnątrzmacicznego,
- D. w 38 tygodniu życia wewnątrzmacicznego.

Zadanie 17.

Nietolerancja lipidów może powodować u dziecka:

- A. zaburzenia perfuzji,
- B. większe ryzyko infekcji,
- C. zaburzenia funkcji leukocytów,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 18.

W hiperglikemii dopuszczalna górna granica stężenia glukozy we krwi u wcześniaka urodzonego <30 tygodnia ciąży, wynosi:

- A. 150 mg%,
- B. 200 mg%,
- C. 250 mg%,
- D. 300 mg%.

Zadanie 19.

Odruch ssania pobudzają:

- A. smak kwaśny,
- B. smak gorzki,
- C. smak słony,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 20.

Produkcja menachinonów (witamina K) u dzieci karmionych naturalnie jest:

- A. nieznacznie wyższa,
- B. niższa,
- C. taka sama jak u dzieci karmionych sztucznie,
- D. znacznie wyższa.

Zadanie 21.

W sytuacji noworodków urodzonych przedwcześnie, które mogą już zacząć próby doustnego przyjmowania pokarmów, należy zwrócić szczególną uwagę na dojrzałość koordynacji łańcucha:

- A. szukanie – ssanie – połykanie,
- B. ssanie – połykanie – oddychanie,
- C. ssanie – oddychanie – połykanie,
- D. szukanie – ssanie – oddychanie.

Zadanie 22.

Ostry zespół abstynencyjny (Neonatal Abstinence Syndrome) pojawia się najczęściej:

- A. 1-5 godzin po urodzeniu i może trwać do 3. miesiąca życia dziecka,
- B. 12-24 godziny po urodzeniu i może trwać do 3. tygodnia życia dziecka,
- C. 24-72 godziny po urodzeniu i może trwać do 3. tygodnia życia dziecka,
- D. 24-72 godziny po urodzeniu i może trwać do 3. miesiąca życia dziecka.

Zadanie 23.

Dominacja bakterii bifidogennych hamuje rozwój bakterii patogennych na skutek:

- A. obniżenie pH treści jelitowej,
- B. konkurencji o składniki odżywcze,
- C. wydzielania naturalnych antybiotyków,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 24.

Podczas karmienia noworodka, u matki po porodzie ukończonym cięciem cesarskim, zalecana jest pozycja:

- A. krzyżowa,
- B. na plecach,
- C. na boku,
- D. klasyczna.

Zadanie 25.

Prawidłowy zakres wartości pH krwi noworodka wynosi:

- A. 7,10-7,19,
- B. 7,20 -7,29,
- C. 7,30-7,40,
- D. 7,41-7,49.

Zadanie 26.

Zamknięcie przewodu tętniczego następuje na skutek:

- A. wzrostu ciśnienia w lewym przedsionku i komorze,
- B. obciążenia wstępnego,
- C. obciążenia następczego,
- D. zwiększonego ciśnienia parcjalnego tlenu.

Zadanie 27.

Do objawów klinicznych w okresie noworodkowym w przebiegu hipotyreozy NIE należy:

- A. obniżone napięcie mięśniowe,
- B. wzmożone napięcie mięśniowe,
- C. sucha skóra,
- D. ochrypli głos.

Zadanie 28.

Pierwszy oddział dla noworodków urodzonych przedwcześnie utworzono w 1922 r. w Chicago w Sarah Morris Hospital. Inicjatorami byli anestezjolog Julius Hess i Evelyn Lundeen. W Polsce pierwszy tego typu oddział powstał:

- A. w 1925 roku w Krakowie, dzięki staraniom doktor Marty Erlich,
- B. w 1925 roku w Warszawie, dzięki staraniom doktor Marty Erlich,
- C. w 1965 roku w Warszawie, dzięki staraniom doktor Łozińskiej,
- D. w 1955 roku w Warszawie, dzięki staraniom doktor Łozińskiej.

Zadanie 29.

Profilaktyka konfliktu w zakresie czynnika Rh, polega na podawaniu matce z czynnikiem:

- A. Rh ujemnym przeciwciał anty D w okresie do 72 godzin,
- B. Rh dodatnim przeciwciał anty D w okresie do 72 godzin,
- C. Rh dodatnim przeciwciał anty D w okresie do 24 godzin,
- D. Rh ujemnym przeciwciał anty D w okresie do 24 godzin.

Zadanie 30.

Objawy nietolerancji laktozy u noworodka, to:

- A. płaczliwość, rozdrażnienie,
- B. głośnie przelewania, duża ilość gazów,
- C. luźne, strzelające stolce,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 31.

Profilaktyka zwicznienia stawów biodrowych noworodka polega na:

- A. częstym powolnym prostowaniem i przywodzeniem kończyn w stawach biodrowych,
- B. zachowaniu fizjologicznej (swobodnej) pozycji kończyn dolnych ze zgięciem i odwiedzeniem,
- C. noszeniu noworodka na rękach z utrzymaniem jednej kończyny w przywiedzeniu,
- D. prawidłowe odpowiedzi B i C.

Zadanie 32.

Mankiet służący do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi u noworodka, od wyrostka barkowego do wyrostka łokciowego powinien obejmować:

- A. 25% długości ramienia,
- B. 55% długości ramienia,
- C. 75% długości ramienia,
- D. 95% długości ramienia.

Zadanie 33.

Środkiem farmakologicznym niesteroidowym przeciwzapalnym stosowanym u noworodków w celu zmniejszenia stresu i bólu jest:

- A. midazolam,
- B. ketamina,
- C. morfina,
- D. paracetamol.

Zadanie 34.

U noworodków hipotroficznych leczenie hipoglikemii przy prawidłowej podaży glukozy może powodować hiperglikemię. Tego rodzaju hiperglikemia może trwać:

- A. do 6 miesięcy,
- B. od 1 miesiąca do 3 miesięcy,
- C. od 2 tygodni do 1 miesiąca,
- D. od kilku dni do 2 tygodni.

Zadanie 35.

Fizjologicznie u stabilnych noworodków urodzonych przedwcześnie i u dzieci urodzonych o czasie, czynnościowe zamknięcie przewodu tętniczego ma miejsce około:

- A. 1. doby życia,
- B. 2. doby życia,
- C. 3. doby życia,
- D. 4. doby życia.

Zadanie 36.

Przy drożnym przewodzie tętniczym (PDA) stwierdza się różnicę między ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym przekraczającą:

- A. 5 mm Hg,
- B. 10 mm Hg,
- C. 20 mm Hg,
- D. 30 mm Hg.

Zadanie 37.

W ocenie rozwoju fizycznego masa ciała dziecka powyżej 90 centyla dla wieku i płci oznacza:

- A. dziecko eutroficzne,
- B. dziecko hipotroficzne,
- C. dziecko hipertroficzne,
- D. brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 38.

Zaobserwowanie u noworodka objawów przypominających cmokanie, żucie w obrębie ust, języka i policzków charakterystyczne jest dla napadu drgawek typu:

- A. subtelnego,
- B. klonicznego,
- C. tonicznego,
- D. toniczno-klonicznego.

Zadanie 39.

Największą grupę spośród lipidów w mleku matki stanowią:

- A. fosfolipidy,
- B. cholesterol,
- C. triglicerydy,
- D. wolne kwasy tłuszczowe.

Zadanie 40.

W jakiej jednostce chorobowej można obserwować petocje, plamicę, siniaki lub krwiaki?

- A. choroba hemolityczna wskutek immunizacji w zakresie czynnika Rh
- B. policytomia noworodków,
- C. zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego,
- D. niedokrwistość wcześniaków.

Zadanie 41.

Do czynników ryzyka martwiczego zapalenia jelit NIE należy:

- A. wcześniactwo,
- B. mała urodzeniowa masa ciała,
- C. przetrwały przewód tętniczy,
- D. nadczynność tarczycy.

Zadanie 42.

Akceleracja rozwoju, to:

- A. opóźnienie tempa rozwoju,
- B. przyspieszenie tempa rozwoju,
- C. równowaga w rozwoju fizycznym,
- D. równowaga w rozwoju psychicznym.

Zadanie 43.

Leki wykazujące działanie teratogenne na cewę nerwową, to:

- A. leki przeciwkrzepliwe,
- B. kwas walproinowy,
- C. leki przeciwdrgawkowe,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 44.

Rekomendowane postępowanie przeciwbólowe w nakłuciu żyły, to:

- A. stosowanie kremu EMLA,
- B. stosowanie glukozy doustnej,
- C. stosowanie stymulacji sensorycznej,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 45.

Pomiary antropometryczne noworodka wykonuje się:

- A. po pierwszym karmieniu piersią,
- B. bezpośrednio po urodzeniu,
- C. przed wypisem do domu,
- D. na pierwszej wizycie patronażowej.

Zadanie 46.

Najczęstszym powikłaniem niepożądanym przy monoterapii zywudyną jest:

- A. niedokrwistość,
- B. hipoglikemia,
- C. nadkrwistość,
- D. nadciśnienie.

Zadanie 47.

Wartość progowa hipoglikemii w pierwszych 24 godzinach życia noworodka wynosi:

- A. 20 mg%,
- B. 30 mg%,
- C. 40 mg%,
- D. 50 mg%.

Zadanie 48.

Szerokie szwy czaszkowe oraz duże ciemiączka sugerować mogą:

- A. wodogłowie,
- B. wczesne zarastanie szwów czaszkowych,
- C. wrodzoną nadczynność tarczycy,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 49.

Zalecaną skalą do oceny bólu u noworodka w intensywnej terapii jest:

- A. skala PIPP,
- B. skala CRIES,
- C. skala NFCS,
- D. skala N-PASS.

Zadanie 50.

Skala Brazeltona służy do oceny:

- A. umiejętności noworodka,
- B. dojrzałości noworodka,
- C. stopnia niewydolności oddechowej u noworodka,
- D. stanu noworodka po urodzeniu.

Zadanie 51.

Choroba Sprengla polega, na:

- A. wrodzonym wysokim ustawieniu łopatki,
- B. bocznym skrzywieniu kręgosłupa,
- C. połączeniu zrostem kostnym lub chrzęstnym kości promieniowej i łokciowej,
- D. skróceniu ciała, potocznie zwanym karłowatością.

Zadanie 52.

Wchłanianie przezskórne leku u noworodka jest największe w:

- A. 33 tygodniu życia,
- B. 34 tygodniu życia,
- C. 35 tygodniu życia,
- D. 36 tygodniu życia.

Zadanie 53.

U noworodka w badaniu neurologicznym nie można ocenić nerwu czaszkowego:

- A. węchowego,
- B. okoruchowego,
- C. błoczkowego,
- D. odwodzącego.

Zadanie 54.

W zależności od drogi nabycia przez noworodka zakażenia dzieli się na wewnątrzmaciczne, okołoporodowe i nabyte. Zakażenie nabyte, to:

- A. wtargnięcie drobnoustrojów do organizmu płodu nastąpiło w czasie ciąży, objawy choroby ujawniają się w 3.-7. dniu po urodzeniu,
- B. zakażenie, do którego dochodzi podczas porodu,
- C. wtargnięcie drobnoustrojów do organizmu noworodka po urodzeniu; dziecko pierwotnie jest zdrowe, objawy pojawiają się po 48-72 godzinach,
- D. wtargnięcie drobnoustrojów do organizmu noworodka po urodzeniu; objawy pojawiają się bezpośrednio po urodzeniu,

Zadanie 55.

Przyjmuje się, że „ilościowym” wskaźnikiem gotowości noworodka do rozpoczęcia pełnego żywienia doustnego, bez negatywnych konsekwencji dla stanu klinicznego i możliwości utrzymania autoregulacji zachowania, jest zjedzenie przez niego co najmniej:

- A. 80% zakładanej dla jego wieku i stanu dziennej dawki pokarmu, przez okres 48 godzin,
- B. 50% zakładanej dla jego wieku i stanu dziennej dawki pokarmu, przez okres 48 godzin,
- C. 90% zakładanej dla jego wieku i stanu dziennej dawki pokarmu, przez okres 72 godzin,
- D. 30% zakładanej dla jego wieku i stanu dziennej dawki pokarmu, przez okres 48 godzin.

Zadanie 56.

U noworodków w pierwszych dniach życia może wystąpić śladowa przejściowa:

- A. erytrocyturia,
- B. glikozuria,
- C. leukocyturia,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 57.

Obserwowanymi u noworodka objawami wynikającymi z zarośnięcia nozdrzy tylnych NIE jest/NIE są:

- A. przetrwanie błony policzkowo-nosowej nozdrzy tylnych,
- B. niedrożność górnych dróg oddechowych z okresową sinicą,
- C. nasilająca się sinica podczas płaczu dziecka,
- D. infekcje górnych dróg oddechowych.

Zadanie 58.

Lek przeciwbólowy, stosowany w sedacji NIE powodujący depresji ośrodka krążenia, to:

- A. fentanyl,
- B. ketamina,
- C. midazolam,
- D. morfina.

Zadanie 59.

Wysokie stężenie tlenu podczas tlenoterapii może powodować:

- A. stres oksydacyjny,
- B. nadciśnienie płucne,
- C. utrzymanie drożności przewodu tętniczego,
- D. prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 60.

Krwotok podpajęczynówkowy manifestuje się następującymi objawami:

- A. wylew krwi podspojówkowo i do siatkówki,
- B. patologiczne objawy neurologiczne, drgawki, bezdechy,
- C. wiotkość kończyn górnych,
- D. chęlboczący, ograniczony guz nad kością ciemieniową,

Zadanie 61.

Bardzo duże wydzielanie hCG w odstępie 3 dni wskazuje na:

- A. ciążę prawidłową,
- B. ciążę pozamaciczną,
- C. ciążową chorobę trofoblastyczną,
- D. żadna z powyższych odpowiedzi.

Zadanie 62.

Podczas sprawowania opieki nad noworodkiem z wrodzoną chorobą metaboliczną wyczuwalny jest karmelowy zapach moczu. Najprawdopodobniej związane jest to z:

- A. chorobą syropu klonowego,
- B. fenyloketonurią,
- C. choroba Huntingtona,
- D. kwasica izowalerianową.

Zadanie 63.

Policytemia noworodków wyraża się w badaniach laboratoryjnych:

- A. wzrostem wartości hematokrytu, spadkiem hemoglobiny,
- B. wyraźnym wzrostem wartości hemoglobiny i hematokrytu,
- C. wzrostem wartości hemoglobiny, spadkiem hematokrytu,
- D. wyraźnym spadkiem wartości hemoglobiny i hematokrytu.

Zadanie 64.

W celu toalety drzewa oskrzelowego i rurki intubacyjnej wcześniaka odłącza się od respiratora i z zachowaniem zasad aseptyki wprowadza się cewnik do rurki intubacyjnej bez zatykania otworu bocznego łącznika. Następnie zatykając palcem otwór łącznika odsysa się wydzielinę w trakcie wyciągania cewnika. Odsysanie wykonuje się poprzez powolne wycofywanie. Po wycofaniu cewnika podaje się wcześniakowi:

- A. do rurki intubacyjnej kilka kropli 0,9% NaCl,
- B. kilka dodatkowych oddechów z respiratora (manual breath),
- C. kilka dodatkowych oddechów aparatem Ambu i podaje się do rurki intubacyjnej kilka kropli wody destylowanej,
- D. kilka dodatkowych oddechów aparatem Ambu i podaje się do rurki intubacyjnej kilka kropli 0,9% NaCl.

Zadanie 65.

Wśród najpoważniejszych niepożądanych objawów leczenia prostaglandynami wad serca obserwuje się:

- A. tachykardię,
- B. hipotensję,
- C. bezdechy,
- D. drgawki.

Zadanie 66.

Podczas transportu lotniczego noworodka, należy:

- A. otworzyć sondę dożołądkową,
- B. opróżnić baloniki w cewnikach,
- C. opróżnić mankiety do mierzenia ciśnienia tętniczego,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 67.

Od kilkunastu lat funkcjonuje w Polsce trójstopniowa organizacja opieki w perinatologii. Oddział pierwszego poziomu:

- A. hospitalizuje ciężarne, położnice i noworodki z najcięższymi patologiami w regionie, prowadzi intensywną terapię najmniejszych dzieci i odpowiada za transport noworodka,
- B. odpowiada za porody fizjologiczne i zdrowego noworodka oraz jest gotowy aby ustabilizować stan chorego noworodka do czasu przyjazdu specjalistycznej karetki noworodkowej,
- C. odpowiada za porody fizjologiczne i zdrowego noworodka zależnie od miejsca zamieszkania noworodka (obowiązuje regionalizacja),
- D. hospitalizuje ciężarne, położnice i noworodki z najcięższymi patologiami w skali kraju oraz jest gotowy aby ustabilizować stan dziecka do czasu przyjazdu specjalistycznej karetki noworodkowej.

Zadanie 68.

Dwie fazy opróżniania żołądka - szybka i wolna, są obecne u noworodka do:

- A. 1-4 dnia życia,
- B. 1-4 tygodnia życia,
- C. 5-10 dnia życia,
- D. 5-10 tygodnia życia.

Zadanie 69.

Czynnik/i wzrostu zawarty/e w mleku matki, to:

- A. czynniki wzrostu hepatocytów,
- B. gastryna, enteroglukagon,
- C. naskórkowy czynnik wzrostu,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 70.

Dobowe zapotrzebowanie noworodka żywnościowo wynosi do:

- A. 20 kcal,
- B. 30 kcal,
- C. 35 kcal,
- D. 40 kcal.

Zadanie 71.

Wśród pozapłucnych przyczyn zaburzeń oddychania u noworodka wymienia się:

- A. przejściowe zaburzenia oddychania,
- B. zarośnięcie nozdrzy tylnych,
- C. bezdech,
- D. krwotok z płuc.

Zadanie 72.

Typowe objawy RDS (Respiratory Distress Syndrome) rozpoczynają się 4-6 godzin po porodzie, a w najcięższych przypadkach nawet zaraz po urodzeniu. Należą do nich wzmożony wysiłek oddechowy oraz:

- A. sinica, przyspieszenie oddechu $>60/\text{min}$,
- B. sinica, zwolnienie oddechu $<20/\text{min}$,
- C. bladość, przyspieszenie oddechu $>60/\text{min}$,
- D. zaczerwienienie, przyspieszenie oddechu $>30/\text{min}$.

Zadanie 73.

Jakie badanie decyduje o rozpoznaniu wady serca u noworodka?

- A. echokardiograficzne,
- B. rentgen klatki piersiowej,
- C. elektrokardiograficzne,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 74.

Niskie stężenie tlenu podczas tlenoterapii może powodować:

- A. hipoksję tkankową,
- B. dysplazję oskrzelowo-płucną,
- C. retinopatię,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 75.

Fizjologiczny ubytek masy ciała wcześniaka urodzonego w 30 tygodniu ciąży obejmuje zakres:

- A. 5-10%,
- B. 10-15%,
- C. 15-20%,
- D. 20-25%.

Zadanie 76.

Najczulszym wskaźnikiem wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu lub noworodka jest wymiar:

- A. obwód głowy (HC),
- B. obwód brzucha (AC),
- C. obwód klatki piersiowej,
- D. długość kości udowej (FL).

Zadanie 77.

Proces odłączenia od respiratora rozpoczyna się od obniżenia wartości tlenu w mieszaninie oddechowej do:

- A. 70-79%,
- B. 61-70%,
- C. 31-40%,
- D. 21-30%.

Zadanie 78.

Wskazania do pobrania krwi kapilarnej u noworodków, to:

- A. ocena gazometrii,
- B. ocena czasu krzepnięcia,
- C. badanie przesiewowe w kierunku chorób metabolicznych,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 79.

Obrzezanie noworodków płci męskiej jest usankcjonowane przez prawo religijne i charakterystyczne:

- A. tylko dla judaizmu,
- B. tylko dla islamu,
- C. dla judaizmu i islamu,
- D. dla judaizmu i prawosławia.

Zadanie 80.

Najbardziej czułym markerem biochemicznym IUGR, jest:

- A. estriol (E3),
- B. alfa-fetoproteina (AFP),
- C. ludzki laktogen łożyskowy (HPL),
- D. gonadotropina kosmówkowa (HCG).

Zadanie 81.

Prawidłowa pielęgnacja kikuta pępowiny, to:

- A. pielęgnacja na sucho, z ewentualnym przemyciem czystą wodą w razie zabrudzenia,
- B. przemywanie kikuta wodnym roztworem gencjany,
- C. stosowanie do przemywania spirytusu 70%,
- D. stosowanie do odkażania spirytusu 90%.

Zadanie 82.

Siarę można wykorzystać do:

- A. pielęgnacji jamy ustnej,
- B. żywienia troficznego,
- C. karmienia noworodka,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 83.

Profilaktyka noworodkowego zapalenia spojówek NIE musi być wykonywana u:

- A. wcześniaków,
- B. noworodków urodzonych przez cięcie cesarskie,
- C. noworodków z wadą urodzeniową,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 84.

Zastosowanie „gniazdek” w opiece nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym m.in. ułatwia rozwój tzw.:

- A. fizjologicznej aktywności zgięciowej, którą dziecko rozwija głównie w ostatnim miesiącu życia wewnątrzmacicznego,
- B. fizjologicznej aktywności wyprostnej, którą dziecko rozwija głównie w ostatnim miesiącu życia wewnątrzmacicznego,
- C. przygięcia, które dziecko rozwija głównie w ostatnim miesiącu życia wewnątrzmacicznego,
- D. odgięcia, które dziecko rozwija głównie w ostatnim miesiącu życia wewnątrzmacicznego.

Zadanie 85.

Referencyjna objętość pokarmu podawanego enteralnie w postaci mleka kobiecego wynosi:

- A. 120-150 ml/kg m.c./dobę,
- B. 150-180 ml/kg m.c./dobę,
- C. 180-210 ml/kg m.c./dobę,
- D. 210-240 ml/kg m.c./dobę.

Zadanie 86.

Najczęstszą przyczyną nadciśnienia płucnego u noworodka donoszonego jest:

- A. wada serca,
- B. hiperbilirubinemia,
- C. niedotlenienie okołoporodowe,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 87.

Współczynnik wczesnej umieralności noworodkowej obejmuje zgony noworodków:

- A. od 0. do 3. doby życia włącznie,
- B. od 0. do 6. doby życia włącznie,
- C. od 0. do 10. doby życia włącznie,
- D. w 0. dobie życia.

Zadanie 88.

Opiekując się noworodkiem podłączonym do aparatu Infant Flow zauważasz spienioną ślinę w jamie ustnej. W celu zachowania drożności przewodu oddechowego:

- A. odessiesz zalegającą wydzielinę w drogach oddechowych,
- B. założysz zgłębnik dożołądkowy w celu odbarczenia powietrza i usunięcia nadmiaru śliny,
- C. skorygujesz nastawy temperatury i nawilżenie gazów oddechowych,
- D. odnotujesz w dokumentacji skuteczność pracującego systemu.

Zadanie 89.

Uwzględniając aspekt kulturowy i religijny w opiece nad noworodkiem pielęgniarka/położna powinny mieć świadomość jakie potrzeby w tym zakresie ma matka/rodzice. Religią, w której rytualnie zawiązuje się delikatną białą bawełnianą nitkę na nadgarstku, wokół szyi lub wokół pięty dziecka, w szóstym dniu po narodzinach jest:

- A. sikhizm,
- B. judaizm,
- C. hinduizm,
- D. prawosławie.

Zadanie 90.

Przy porażeniu typu Klumpkego noworodek:

- A. nie wykonuje ruchów odwodzenia, zginania i rotacji zewnętrznej w stawie ramiennym,
- B. nie wykonuje ruchów przywodzenia, zginania i rotacji zewnętrznej w stawie ramiennym,
- C. nie wykonuje ruchów przedramieniem, nadgarstkiem i palcami ręki,
- D. wykonuje ruchy przedramieniem, nadgarstkiem i palcami ręki.

Zadanie 91.

Prawidłowe napięcie dolnego zwieracza przełyku u noworodka pojawia się między:

- A. 3-4 dniem życia,
- B. 1-4 tygodniem życia,
- C. 4-10 tygodniem życia,
- D. 10-12 tygodniem życia.

Zadanie 92.

Zgodnie z najnowszymi zaleceniami Amerykańskiej Akademii Pediatrii u noworodków z niewydolnością nerek w żywieniu parenteralnym, pomija się podaż:

- A. manganu,
- B. miedzi,
- C. chromu,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 93.

Zmiany na skórze noworodka spowodowane wpływem hormonów matki, to:

- A. trądzik różowaty,
- B. rumień toksyczny,
- C. potówki,
- D. trądzik noworodkowy.

Zadanie 94.

Żółtaczka u noworodków staje się widoczna przy stężeniu bilirubiny we krwi obwodowej:

- A. 1-2 mg/dl,
- B. 2-3 mg/dl,
- C. 4-5 mg/dl,
- D. 5-7 mg/dl,

Zadanie 95.

Głównym wskaźnikiem prawidłowego żywienia jest przyrost masy ciała wynoszący ok.:

- A. 8-11 g/kg/dobę,
- B. 12-16 g/kg/dobę,
- C. 17-20 g/kg/dobę,
- D. 21-24 g/kg/dobę.

Zadanie 96.

Ruchomość żuchwy podczas ssania pozwala na ocenę nerwu czaszkowego:

- A. trójdzielnego,
- B. twarzowego,
- C. językowo-gardłowego,
- D. błędnego.

Zadanie 97.

Złamanie obojczyka należy leczyć przez unieruchomienie na 7-10 dni. Stosuje się w tym celu bandaże zakładany w kształcie ósemki lub specjalną taśmę (plaster). Unieruchomienie stosuje się przy złamaniu obojczyka:

- A. typu zielonej gałązki,
- B. całkowitym,
- C. częściowym bez przemieszczenia,
- D. częściowym bez uszkodzenia okostnej,

Zadanie 98.

Żywienie i pojenie dziecka w okresie opieki paliatywnej jest według etyki medycznej:

- A. zwyczajnym środkiem medycznym,
- B. nadzwyczajnym środkiem medycznym,
- C. zwyczajnym środkiem leczniczym, ale tylko w przypadku pojenia,
- D. wszystkie odpowiedzi są fałszywe.

Zadanie 99.

Ocena oralnych reakcji odruchowych u noworodka obejmuje:

- A. reakcje kłusania i połykania,
- B. reakcje żuchwowe i ssania,
- C. reakcje wargowe i szukania,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 100.

Proszę wskazać prawidłową odpowiedź. Surfaktant:

- A. składa się z 90% białek i 10% lipidów,
- B. posiada zdolność obniżania napięcia powierzchniowego w pęcherzykach płucnych,
- C. jest bakteriostatyczny,
- D. prawidłowe odpowiedzi B i C.

Zadanie 101.

U wcześniaków urodzonych >28 tygodnia życia płodowego zaleca się utrzymanie SpO₂ w zakresie:

- A. 95-100%,
- B. 90-95%,
- C. 85-100%,
- D. 80-85%,

Zadanie 102.

Podczas badania przedmiotowego wywołując objaw oczu lalki można ocenić nerw czaszkowy:

- A. I,
- B. II,
- C. III, IV, VI,
- D. IX, X.

Zadanie 103.

Wśród objawów klinicznych zaburzeń oddychania pochodzenia krążeniowo-płucnego u noworodka, wymienia się:

- A. oddechy powyżej 60 na minutę,
- B. wzmożony wysiłek oddechowy,
- C. sinicę,
- D. przesunięcie śródpiersia.

Zadanie 104.

Najwięcej negatywnych emocji u kobiety ciężarnej pojawia się:

- A. w I i II trymestrze,
- B. w I i III trymestrze,
- C. w II i III trymestrze,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 105.

Zespół ekspertów ds. Rekomendacji Etycznych w Perinatologii, opracowujący wytyczne odnośnie postępowania z noworodkiem na granicy możliwości przeżycia w sytuacji noworodka z prawidłowo określonym wiekiem ciążowym zaleca:

- A. przed 22. tygodniem ciąży (< 22 0/7) opiekę ograniczoną do działań paliatywnych, natomiast jeśli wiek ciążowy wynosi ukończone 22 tygodnie ciąży (22 0/7) do 22 tygodni ciąży i 6 dni (22 6/7) resuscytację i podtrzymywanie funkcji życiowych,
- B. przed 23. tygodniem ciąży (< 23 0/7) opiekę ograniczoną do działań paliatywnych, natomiast jeśli wiek ciążowy wynosi ukończone 23 tygodnie ciąży (23 0/7) do 23 tygodni ciąży i 6 dni (23 6/7) opiekę paliatywną, chyba, że pojawią się czynniki poprawiające rokowanie,
- C. przed 23. tygodniem ciąży (< 23 0/7) opiekę ograniczoną do działań paliatywnych, natomiast jeśli wiek ciążowy wynosi ukończone 23 tygodnie ciąży (23 0/7) do 23 tygodni ciąży i 6 dni (23 6/7) resuscytację i podtrzymywanie funkcji życiowych,
- D. przed 24. tygodniem ciąży (< 24 0/7) opiekę ograniczoną do działań paliatywnych, natomiast jeśli wiek ciążowy wynosi ukończone 24 tygodnie ciąży (24 0/7) do 24 tygodni ciąży i 6 dni (24 6/7) resuscytację i podtrzymywanie funkcji życiowych.

Zadanie 106.

W badaniu neurologicznym noworodka w reakcji na światło odruch Peipera polega na:

- A. wystąpieniu oczopląsu,
- B. wystąpieniu zeza,
- C. ruchu gałek odwrotnie do ruchu głowy,
- D. zaciśnięciu powiek.

Zadanie 107.

Przeciwwskazaniem do minimalnego żywienia doustnego u wcześniaka są wszystkie poniższe odpowiedzi, Z WYJĄTKIEM:

- A. niedrożność przewodu pokarmowego,
- B. krwawienie z przewodu pokarmowego,
- C. masa ciała poniżej 1600 gram,
- D. drgawki trudno poddające się leczeniu.

Zadanie 108.

Obrzęk piersi najczęściej wynika z:

- A. patologicznej budowy piersi,
- B. wzrostu poziomu progesteronu i poziomu prolaktyny,
- C. spadku poziomu progesteronu i wzrostu poziomu prolaktyny,
- D. nieprawidłowej techniki karmienia.

Zadanie 109.

Skale używane do oceny NAS (Neonatal Abstinence Syndrome) u noworodków, to:

- A. Skala Finnegana, Skala Lipsitza, Skala Ostre'a,
- B. Skala Apgar, Skala Lipsitza, Skala Finnegana,
- C. Skala Ostre'a, Skala Silvermana,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 110.

Do najczęstszych wad rozwojowych przewodu pokarmowego u noworodków matek z cukrzycą NIE należy:

- A. zarośnięcie przełyku,
- B. zarośnięcie dwunastnicy,
- C. zespół niedorozwoju lewej okrężnicy,
- D. brak odbytu.

Zadanie 111.

Według WHO oraz ESPEGAN wyłączne karmienie piersią powinno trwać przez:

- A. 3 miesiące,
- B. 5 miesięcy,
- C. 6 miesięcy,
- D. przez 9 miesięcy.

Zadanie 112.

Podczas leczenia zespołu hipoplazji lewego serca:

- A. należy zwiększyć stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej,
- B. nie należy podawać leków rozszerzających naczynia,
- C. nie należy podawać tlenu do oddychania,
- D. prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 113.

Optymalnym czasem dla wykonania ultrasonografii dwuwymiarowej w celu zdiagnozowania IUGR jest:

- A. 12. tydzień ciąży,
- B. 32. tydzień ciąży,
- C. 34. tydzień ciąży,
- D. 36. tydzień ciąży.

Zadanie 114.

W obserwacji jamy ustnej duży język może sugerować:

- A. obecność naczyniaka naczyń limfatycznych języka,
- B. wrodzoną niedoczynność tarczycy,
- C. glikogenozę,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 115.

Objawy, takie jak obrzęk części przodującej główki, zwykle na obszarze przekraczającym granice kości czaszki, resorbuje się w ciągu kilku godzin lub dni, nie wymaga leczenia, charakteryzuje następujący uraz okołoporodowy:

- A. krwotok podpajęczynówkowy,
- B. krwawienie podtwardówkowe.
- C. przedgłowie,
- D. krwiak podokostnowy.

Zadanie 116.

Przyczyny pozapłucne zaburzeń oddechowych w okresie noworodkowym, to:

- A. przepuklina przeponowa,
- B. hipoglikemia,
- C. zespół Beckwitha-Wiedemanna,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 117.

Do objawów płodowych w hipotyreozy NIE należy:

- A. tachykardia,
- B. bradykardia,
- C. opóźnienie wieku kostnego,
- D. wielowodzie.

Zadanie 118.

Początkowa ilość mleka w żywieniu troficznym wynosi:

- A. 5-15 ml/kg m.c./dobę
- B. 10-24 ml/kg m.c./dobę
- C. 5-24 ml/kg m.c./godzinę,
- D. 0,1-24 ml/kg m.c./dobę.

Zadanie 119.

Najczęściej występujące pierwotne przyczyny wywołujące zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC), to:

- A. niedotlenienie,
- B. zakażenie uogólnione,
- C. zespół zaburzeń oddychania,
- D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 120.

Czynniki predysponujące do refluksu żołądkowo-jelitowego w okresie noworodkowym, to:

- A. brzuszny tor oddychania,
- B. obniżone ciśnienie śródbrzuszne,
- C. duża objętość żołądka,
- D. prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 121.

Zgodnie z „Wytycznymi WHO dotyczącymi higieny rąk w opiece zdrowotnej” w zakresie wykorzystania rękawic:

- A. należy zawsze używać rękawic, gdy można racjonalnie oczekiwać, że dojdzie do kontaktu z krwią lub innym potencjalnie zakaźnym materiałem, błoną śluzową lub naruszoną powłoką skóry,
- B. używając rękawic, nie należy ich zmieniać, jeżeli podczas wykonywania opieki nad pacjentem przechodzi się od zakażonych powierzchni ciała do innych części ciała pacjenta lub przedmiotów w jego otoczeniu,
- C. do wszystkich zabiegów przy jednym pacjencie należy użyć jednej pary rękawic,
- D. należy stosować wszystkie wymienione wyżej wytyczne.

Zadanie 122.

Zamieszczone w internecie ogłoszenie o treści: "Jestem młody i zdrowy, sprzedam nerkę, mogę uratować komuś życie, cena do negocjacji". Czyn taki jest:

- A. prawnie dozwolony,
- B. dozwolony, lecz gdyby doszło do "transakcji" stanowiłby przestępstwo,
- C. wykroczeniem,
- D. przestępstwem.

Zadanie 123.

Celem reklamy jest:

- A. osiągnięcie wzrostu sprzedaży firmy,
- B. dotarcie do świadomości klientów tak, aby zainteresować ich ofertą i skłonić do zakupu,
- C. zwiększenie stopnia znajomości otoczenia firmy,
- D. utrzymanie wzrostu sprzedaży firmy na stałym poziomie.

Zadanie 124.

Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej uregulowane są w:

- A. ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r.,
- B. ustawie o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r.,
- C. ustawie o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r.,
- D. ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 stycznia 1996 r.

Zadanie 125.

Zgodnie z opracowaniem „Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej - podsumowanie”, naturalne paznokcie należy krótko obcinać, końcówki paznokci nie mogą być dłuższe niż:

- A. 0,2 cm,
- B. 0,3 cm,
- C. 0,4 cm,
- D. 0,5 cm.

Zadanie 126.

Komunikacja niewerbalna charakteryzuje się:

- A. systemem znaków,
- B. niepowiązaniem systemu i formy przekazu,
- C. precyzyjnością komunikatu,
- D. ciągłością trwania przez cały czas interakcji.

Zadanie 127.

W skład zespołu terapeutycznego wchodzi zawsze:

- A. lekarz, pielęgniarka, pacjent,
- B. lekarz, pielęgniarka, pacjent, psycholog,
- C. pacjent, psycholog, pielęgniarka, kapelan,
- D. lekarz, pacjent, rodzina pacjenta, pielęgniarka.

Zadanie 128.

Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce?

- A. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- B. każda uczelnia posiadająca prawo do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego,
- C. każda rada wydziału posiadająca prawo do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego,
- D. Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zadanie 129.

Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa?

- A. nie, jest dobrowolna,
- B. tak, jednak za zgodą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych można wykonywać zawód pielęgniarki bez przynależności do samorządu zawodowego,
- C. tak, przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa,
- D. tak, przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa dla pielęgniarek i położnych, które posiadają wykształcenie przynajmniej na poziomie licencjata lub uzyskały tytuł specjalisty.

Zadanie 130.

Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych definiowana jest jako wykorzystanie najlepszych dowodów naukowych przy podejmowaniu decyzji dotyczących wysokiej jakości opieki nad pacjentem. Dowody te NIE powinny być dostarczane poprzez:

- A. prowadzenie badań naukowych prowadzonych przez pielęgniarki,
- B. skalą oceniającą praktyczną wartość badań medycznych,
- C. analizę piśmiennictwa naukowego,
- D. obserwację skuteczności wykonywanych procedur medycznych.

Zadanie 131.

Motywowanie polega na zespole oddziaływań, zmierzających do:

- A. skłaniania pracowników do podejmowania i realizacji przyszłościowych, oczekiwanych, ale z równoczesnym ukazaniem sankcji – w celu lepszej motywacji, jeżeli nie wykona poleconych celów, misji i zadań,
- B. skłaniania pracowników do podejmowania i realizacji oczekiwań kolegów, podwładnych oraz przełożonych do ich realizacji,
- C. nakłaniania pracowników do podejmowania i realizacji oczekiwań podwładnych oraz przełożonych do ich realizacji w zamian za docelowe przyznanie pracownikom pieniężnej nagrody,
- D. efektywnego skłaniania pracowników do podejmowania i realizacji oczekiwanych celów, funkcji i zadań, a także przyjmowania preferowanych przez motywującego postaw i zachowań.

Zadanie 132.

Indeks Hirscha:

- A. jest związany z oceną autora publikacji naukowej,
- B. jest związany z oceną czasopisma naukowego,
- C. dotyczy sposobu indeksacji publikacji naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- D. dotyczy sposobu indeksacji publikacji naukowych w Polskiej Bibliografii Lekarskiej.

Zadanie 133.

Fundamentalne założenie w zarządzaniu ludźmi mówi, że najważniejszym zasobem organizacji jest/są:

- A. infrastruktura,
- B. ludzie,
- C. ludzie i infrastruktura,
- D. przedsiębiorstwo.

Zadanie 134.

Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

- A. studia I stopnia pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego w tym zakresie,
- B. studia I stopnia lub posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa,
- C. studia II stopnia lub posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego w tym zakresie,
- D. studia II stopnia pod warunkiem ukończenia kursu kształcącego w tym zakresie.

Zadanie 135.

Prawidłowo prowadzona rekrutacja i selekcja stanowią jedno z najważniejszych zadań w obszarze pracowników firmy usługowej. Dział kadr poszukuje kandydatów, korzystając często z usług specjalistycznych agencji wyszukujących odpowiedniej osoby, zamieszczając ogłoszenie w prasie, czy prowadząc rekrutację wśród studentów. Proces selekcji kandydatów obejmuje:

- A. sporządzenie dokładnego opisu stanowiska, przyciąganie kandydatów,
- B. określenie profilu osobistego wg kryteriów dyrekcji, rozmowa kwalifikacyjna,
- C. opis stanowiska i kryteria psychologiczne,
- D. określenie profilu osobistego i socjalizacja przyszłego kandydata.

Zadanie 136.

Komunikowanie bezpośrednio ma charakter interakcyjny, to znaczy:

- A. przebiega tylko pomiędzy osobami dobrze się znającymi,
- B. przebiega za pośrednictwem mediów społecznościowych,
- C. dotyczy przynajmniej dwóch osób wchodzących we wzajemne relacje,
- D. przebiega za pomocą ściśle określonego kodu.

Zadanie 137.

Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością czyli zakres wiedzy jaki powinien posiadać pacjent, w tym m. in. profilaktyka, jakie leki brać, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zaliczamy:

- A. brak komunikacji pacjent a lekarz czy pielęgniarka/położna,
- B. brak komunikacji dyrekcja – personel,
- C. nieprawidłowy mechanizm finansowania ze strony płatnika,
- D. nieprawidłowe finansowanie ze strony budżetu państwa.

Zadanie 138.

W jakim zakresie pacjent, który nie ukończył 16 lat ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu?

- A. w pełnym zakresie, ponieważ konieczne jest to do uzyskania świadomej zgody,
- B. w zakresie ograniczonym dobrem małoletniego pacjenta i jego stopniem rozwoju,
- C. w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego,
- D. w zakresie, w jakim informacji tej udziela mu jego przedstawiciele ustawowi (rodzice), którym przysługuje pełna informacja.

Zadanie 139.

Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

- A. zachorowalność, śmiertelność, przyrost naturalny,
- B. chorobowość, płodność kobiet, oczekiwana długość życia,
- C. zachorowalność, chorobowość, umieralność,
- D. zapadalność, śmiertelność, wskaźnik rozwoju ludzkości.

Zadanie 140.

Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada/ją:

- A. pacjent i jego rodzina,
- B. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy bądź osoba przez niego upoważniona,
- C. pacjent i jego najbliższa rodzina (małżonek, rodzice i dzieci),
- D. tylko osoba upoważniona przez pacjenta.