

Dziękujemy Ci, że pomagasz chronić dzieci przed ROTAWIRUSAMI



Poinformuj rodziców o **szczepieniach
ochronnych**, które są **najskuteczniejszą
formą profilaktyki zakażeń
rotawirusowych.**²

ROTARIX:

Zawiesina doustna. Szczepionka przeciw rotawirusom, żywa.

Szczepionka Rotarix jest wskazana do czynnej immunizacji niemowląt w wieku od 6. do 24. tygodni w celu zapobiegania zapaleniu żołądka i jelit spowodowanemu zakażeniem rotawirusem.³

Przykładowe dawkowanie:



* Dwudawkowy cykl szczepień musi zostać ukończony przed upływem 24. tygodnia życia dziecka, ale najlepiej, aby został ukończony przed 16. tygodniem życia.

Szczepionka Rotarix jest przeznaczona wyłącznie do stosowania doustnego.³

Dawkowanie i sposób podania:³

Cykl szczepień składa się z 2. dawek. Pierwszą dawkę można podać po ukończeniu 6. tygodnia życia. Odstęp pomiędzy dawkami powinien wynosić przynajmniej 4 tygodnie. 2-dawkowy cykl szczepienia musi zostać ukończony przed upływem 24. tygodnia życia dziecka, ale najlepiej, aby został ukończony przed 16. tygodniem życia. Zalecane jest, aby u dzieci, które jako pierwszą dawkę otrzymały Rotarix, dwudawkowy schemat szczepienia został ukończony również szczepionką Rotarix.

Referencje: 1. Jackowska T. et al. Zakażenia rotawirusowe - aktualne zalecenia i propozycje dotyczące zapobiegania; *Pediatrya Polska*, Tom 89, Nr 3, Maj-Czerwiec 2014.; 2. Pierwsze 2 lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców. Jak dbać o rozwój, pielęgnować i zapobiegać chorobom. Praca zbiorowa pod redakcją A. Chybickiej, A. Dobrzańskiej, J. Szczapy i J. Wysockiego. *Medycyna Praktyczna*, Kraków 2012. str.229 – 233.; 3. Charakterystyka Produktu Leczniczego Rotarix, GSK, pl.gsk.com [ostatni dostęp: maj 2017]